

Fuente: La Hora

Fecha: 23 de junio de 2011

Título: Ambato cuenta con el segundo mejor banco de leche materna del Ecuador

Link: [http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101162587/-1/El\\_Hospital\\_Docente\\_entrega\\_el\\_1%C3%ADquido\\_vital\\_para\\_beb%C3%A9s\\_de\\_manera\\_gratuita\\_a\\_quienes\\_acuden\\_a\\_este\\_centro.\\_La\\_calidad\\_est%C3%A1\\_garantizada\\_gracias\\_a\\_equipos\\_de\\_punta\\_con\\_los\\_que\\_cuenta\\_este\\_centro\\_de\\_salud..html](http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101162587/-1/El_Hospital_Docente_entrega_el_1%C3%ADquido_vital_para_beb%C3%A9s_de_manera_gratuita_a_quienes_acuden_a_este_centro._La_calidad_est%C3%A1_garantizada_gracias_a_equipos_de_punta_con_los_que_cuenta_este_centro_de_salud..html)

Noticias Tungurahua

## **Ambato cuenta con el segundo mejor banco de leche materna del Ecuador**

Jueves, 23 de Junio de 2011



**ALMACENAMIENTO.** La leche materna recogida es expuesta a una serie de exámenes y conservada en congeladores especializados.

Ambato cuenta con el segundo mejor Banco de Leche Materna a escala nacional. Se trata del Hospital Docente Ambato, entidad que a diario abastece de este alimento a decenas de neonatos para bajar los índices de mortalidad y desnutrición de bebés.

Para llegar a este reconocimiento, el hospital ambateño tiene un riguroso proceso de recolección. Una vez extraída la leche, esta es sometida a exámenes físico-químico donde se conoce el grado de acidez, pasteurización y pruebas microbiológicas para conocer la calidad de la leche.

La leche es congelada a menos 17 grados centígrados y el tiempo de consumo es de seis meses; el grado de temperatura para el consumo es de 22 a 26 grados centígrados.

Todos estos controles se logran gracias a que el hospital cuenta con equipos especializados similares al que tiene la Maternidad Isidro Ayora, que es considerada la mejor del Ecuador.

### **Requisitos para donar**

La madre que desea donar deben cumplir con varios requisitos entre los primordiales están los exámenes de VIH (SIDA), el VRDL y físicos de la personas donante.

Para recolectar la leche materna se realizan campañas o la donación voluntaria donde acuden personas de otras provincias.

